

PREGUNTAS FRECUENTES

ADAPTADOR® VIT - ADAPTADOR® MIN

¿Debería Usar Kit Adaptador si en mi establecimiento ya uso otros Suplementos y los análisis de sangre de mis animales arrojan resultados normales?

Rta: El kit Adaptador no está hecho para suplementar a los animales sino para adelantarse a una situación estresante que genere menor consumo de alimento y mayores requerimientos de estos elementos. Por esta razón resulta ideal para usar en establecimientos que ya dan suplementos minerales por vía oral pero que están por realizar maniobras estresantes, como destetes, vacunaciones, ingresos a corral o inseminaciones.

¿Debo realizar análisis de sangre antes de suplementar con Kit Adaptador?

Rta: No es necesario. Kit Adaptador no es un suplemento, se usa para prevenir pérdidas en situaciones de estrés. Su resultado es mayor si se usa en animales que ya vienen suplementados, pero que tendrán una exigencia mayor por una situación estresante que necesariamente aumentará sus requerimientos de antioxidantes.

Le di a mi rodeo una inyección de selenio antes del parto. ¿Es demasiado pronto para suplementar con Kit Adaptador? ¿Puede causar toxicidad?

Rta: No existen riesgo de intoxicación en esta situación planteada, se podría administrar sin ningún riesgo Kit Adaptador. Incluso pueden ser necesarias dosis frecuentes de Adaptador cuando los animales son sometidos a situaciones estresantes graves.

¿Que diferencia el Kit adaptador de los otros minerales inyectables del mercado?

Rta: Kit Adaptador está formulado para evitar consecuencias productivas, inmunológicas o reproductivas secundarias al estrés. Conceptualmente es un antioxidante, con sus componentes balanceados para colaborar con la defensa antioxidante. La mayoría de los productos inyectables del mercado son suplementos minerales que buscan generar reservas en el organismo, aunque esto genere daño oxidativo, como productos con elevadas cantidades de cobre.

¿Qué modelo de suplementación recomiendan para lecherías del alta producción?

Rta: Existen modelos de suplementación con resultados probados en lechería. Uno de ellos indica el uso de tres dosis para vacas en transición (una dosis al secado, otra al ingresar al parto y finalmente una última al parto). En igual sentido se recomiendan una a dos dosis antes de la inseminación (durante el alta reproductiva y la segunda al colocar el dispositivo intrauterino de progesterona).

¿Qué modelo de suplementación recomiendan para animales que ingresan a confinamiento?

Rta: En caso de recibir animales transportados en camiones, se recomienda suplementar con una dosis de Kit Adaptador antes de salir del campo, y repetir al momento de la llegada, aunque sólo hayan pasado unas horas. Si la adaptación de los animales se prevé complicada, se recomienda una tercera dosis al hacer el manejo sanitario de los animales (junto a la vacunación, desparasitación, etc).

PREGUNTAS FRECUENTES

ADAPTADOR® VIT - ADAPTADOR® MIN

¿Cuánto dura el efecto del kit adaptador?

Rta: Si bien el Kit está diseñado para cubrir una situación de adaptación fisiológica típica de 21 días, en casos de estrés extremo se puede agotar antes, por lo cual se sugiere aumentar el número de dosis preventivas o repetir la dosis en un intervalo menor.

¿Qué modelo de suplementación recomiendan para animales en guacheras?

Rta: Se recomienda el uso de una dosis de Kit Adaptador en cada cambio de categoría. También se debe agregar una dosis como complemento en casos de cuadros clínicos de diarreas o neumonías, para favorecer la respuesta inmune.

¿Qué modelo de suplementación recomiendan para animales en IATF en rodeos de cría?

Rta: Se recomiendan dos dosis antes de la inseminación (durante el alta reproductiva y la segunda al colocar el dispositivo intrauterino de progesterona).

¿Cómo complemento el uso de suplementos inyectables como el Suplenut con el Kit Adaptador en rodeos de cría o recria?

Rta: Cuando en el establecimiento se usan suplementos como el Suplenut en intervalos definidos (3 o 4 meses), se recomienda reemplazar el Suplenut por Kit Adaptador si los animales son sometidos a un manejo estresante, como destete, castración o cambio de potrero o dieta.

PREGUNTAS FRECUENTES

SUPLENUT®

¿Qué ventajas competitivas posee con respecto a otros productos del mercado?

Rta: **SUPLENUT®** fue desarrollado para optimizar sus condiciones como suplemento mineral. Con relación al cobre, posee una dosis terapéutica que garantiza la generación de reserva hepática, pero suficientemente ajustada para evitar casos de toxicidad. Esta posibilidad se minimiza aún más al contar con una dosis graduada (1 mL/50 kg), y una presentación que no sedimenta ni es viscosa, evitando errores de dosificación. Con respecto al Zn, **SUPLENUT®** aporta una dosis terapéutica que revierte los signos de carencia y mantiene elevados niveles durante períodos de adaptación y entre tratamientos con cobre, permitiendo que el animal mejore la capacidad de almacenar el cobre inyectado, minimizando los riesgos hepatotóxicos. **SUPLENUT®** ha sido desarrollado para evitar reacciones en el sitio de inyección, con capacidad de generar buena reserva hepática de cobre y permitir su uso frecuente en zonas con carencias severas.

¿Cómo se realiza un plan sanitario con SUPLENUT®?

Rta: El paso inicial es el diagnóstico, determinando si el establecimiento es de alto, moderado o bajo riesgo. En sistemas de cría se emplea el siguiente esquema de suplementación:

Establecimientos de moderado a alto riesgo:

- Una dosis a las madres en el último tercio de la gestación y una dosis al inicio del período de servicio,
- una dosis a los terneros a los cuatro meses de edad y luego una dosis cada dos meses hasta el destete.

Establecimientos de bajo riesgo:

- Una dosis a las madres al inicio del período de servicio, una dosis a los terneros a los cuatro meses de edad y otra al destete.

En sistemas de recría y engorde se emplea el siguiente esquema de suplementación:

Establecimientos de alto riesgo:

- Cuatro dosis anuales.

Establecimientos de moderado riesgo:

- Tres dosis anuales.

Establecimientos de bajo riesgo:

- Dos dosis anuales. Las dosis anuales no necesariamente deben ser equidistantes, sino que es preferible que se concentren en los períodos lluviosos.

En sistemas de lechería se emplea el siguiente esquema de suplementación para las hembras en lactancia:

Establecimientos de alto riesgo:

- Una dosis a las madres en el último tercio de la gestación y una dosis al inicio del período de servicio.

Establecimientos de moderado riesgo:

- Una dosis al inicio del período de servicio.

Establecimientos de bajo riesgo:

- Una dosis al inicio del período de servicio. Las terneras de reposición deben seguir el esquema propuesto para cría y recría.

¿Con qué frecuencia debe ser administrado?

Rta: **SUPLENUT®** fue desarrollado para evitar cuadros de intoxicación, por lo cual no posee efectos adversos a la dosis indicada en prospecto. Su toxicidad es sólo esperable si se eleva la dosis sugerida por error en la dosificación. En casos de necesitar aumentar la suplementación, es posible aplicar una segunda dosis a las 48 a 72 hs sin riesgos para la salud del animal. Cuando se desconoce el nivel de carencia en el establecimiento se recomienda evaluar el mismo y luego diseñar un plan de suplementación más ajustado.